

# Gladio

Confezioni 1,5 g/100 g crema tubo 50 g

## A cosa serve

**Gladio** è un farmaco a base del principio attivo **Aceclofenac**, appartenente alla categoria degli **Analgesici FANS** e nello specifico **Antinfiammatori non steroidei per uso topico**. E' commercializzato in Italia dall'azienda **Abiogen Pharma S.p.A.**

**Gladio** può essere prescritto con **Ricetta SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco**.

**Gladio** serve per la terapia e cura di varie malattie e patologie come .

---

## Informazioni commerciali sulla prescrizione

**Titolare:**Abiogen Pharma S.p.A.

**Concessionario:**Abiogen Pharma S.p.A.

**Ricetta:**SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco

**Classe:**C

**Principio attivo:**Aceclofenac

**Gruppo terapeutico:**Analgesici FANS

**Forma farmaceutica:**crema

---

## Indicazioni

Trattamento locale degli stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti quali: tendiniti, tenosinoviti, distorsioni, contusioni, periartriti, dislocazioni, lombaggine, torcicollo, borsiti, stiramenti e postumi da traumi.

---

## Posologia

Applicare da 1,5 a 2 grammi di GLADIO 1,5 g/100 g crema, pari a 4-5 cm, 3 volte al giorno sulla parte interessata o secondo diversa prescrizione medica.

---

## Controindicazioni

Ipersensibilità al principio attivo (aceclofenac) o a farmaci antinfiammatori non steroidei, incluso l'acido acetilsalicilico, o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.

Pazienti a cui l'acido acetilsalicilico o ...

---

## Avvertenze speciali e precauzioni di impiego

Solo per uso esterno. GLADIO 1,5 g/100 g crema non deve essere applicato su piaghe o ferite aperte. Evitare il contatto con gli occhi o con membrane mucose o con ...

---

## Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione

Sebbene non siano ancora disponibili informazioni sulle interazioni di aceclofenac crema, si raccomanda cautela quando viene usato con litio, digossina, agenti anticoagulanti orali, diuretici e antidolorifici.

...

Prima di prendere "**Gladio**" insieme ad altri farmaci come , etc., chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute ...

---

## Assumere Gladio durante la gravidanza e l'allattamento

Posso prendere Gladio durante la gravidanza e l'allattamento?

Sebbene negli studi sperimentali non si siano osservati effetti teratogeni, non è stata stabilita la sicurezza di aceclofenac in donne in gravidanza e durante l'allattamento, quindi la somministrazione non è ...

---

## Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

Gladio non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

...

---

## Effetti indesiderati

Le reazioni avverse più comunemente segnalate sono lieve o moderata irritazione accompagnata da arrossamento e lieve prurito che scompaiono con l'interruzione del trattamento.

Eccezionalmente, durante la varicella è stato segnalato ...

---

## Sovradosaggio

Non sono noti casi di sovradosaggio. In caso di uso improprio o ingestione accidentale, intervenire con misure terapeutiche generali del tipo normalmente adottato in caso di avvelenamento con farmaci antinfiammatori ...

---

## Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: antinfiammatori non steroidei per uso topico, codice ATC: M02AA

Aceclofenac è un antinfiammatorio non-steroido appartenente alla classe degli analoghi dell'acido fenilacetico.

Negli studi condotti su diversi modelli di ...

---

## Proprietà farmacocinetiche

Studi di farmacocinetica dimostrano che l'assorbimento percutaneo di aceclofenac crema varia percentualmente in misura compresa tra 25-85% nelle diverse specie animali investigate (ratto e cane) con una buona permanenza in ...

---

## Dati preclinici di sicurezza

Tossicità acuta (DL50): topo e.v. 149-169 mg/kg (maschi-femmine), p.o. 211 mg/kg; ratto e.v. 94-137 mg/kg (maschi-femmine).

Tossicità cronica: ratto p.o. 4 settimane: assenza di tossicità fino a 3 mg/kg/die; ratto ...

---

## Elenco degli eccipienti

Cera emulsionante, paraffina liquida, propilparaidrossibenzoato, metilparaidrossibenzoato, acqua purificata.

...

---

## Farmaci Equivalenti

I farmaci equivalenti di **Gladio** a base di **Aceclofenac** sono: **Airtal ...**